

# СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 39 от 17 мая 2022 года



Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, 17 e-mail: [rsc80@mail.ru](mailto:rsc80@mail.ru)

Исх № 82/4-187 от 17.05.2022 г.

## МИЛДЬЮ ВИНОГРАДА



Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что наступили сроки обработки виноградных насаждений против милдью винограда.

Милдью — болезнь, которая больше известна, как ложная мучнистая роса. Характерный признак поражения милдью —

появление маслянистых пятен с верхней стороны и со спороношением на нижней поверхности листа в виде белого слабозаметного паутинистого налета. Сильно пораженные листья буреют, усыхают и опадают, что приводит к ослаблению виноградного растения. Спороношение возбудителя лучше всего заметно на молодых листьях. Симптомами позднего проявления милдью в конце вегетационного периода являются нектротизация листьев и наличие спороношения патогена на нижней их поверхности без появления маслянистых пятен.

При благоприятных условиях и сохранении капельно-жидкой среды в течение 2 суток поверхность соцветий может быстро покрыться белым налетом патогена.

Пораженные ягоды после цветения покрываются белым налетом возбудителя и через некоторое время буреют и отмирают. Зараженные ягоды в поздний период синеют, сморщиваются и мумифицируются.

Милдью является самой опасной болезнью виноградной лозы и приводит к большим потерям: преждевременно опадают листья, вследствие чего побеги оголяются, происходит отмирание отдельных ягод или целых гроздей, ослабляется растение и плохо вызревает лоза, сахаристость ягод снижается и качество вина ухудшается. Урожайность падает до 40%.

Для предупреждения эпифитотия болезни, убедительно просим руководителей хозяйств организовать мониторинг виноградных насаждений. В случае обнаружения первых признаков болезни, руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

Рекомендованы к использованию препараты: Квадрис, СК (0,6-0,8 л/га), Эфатол, СП (2,5 кг/га), Акробат Топ, ВДГ (1,2-1,5 кг/га), Делан, ВГ (0,5-0,7 кг/га), Малвин, ВДГ (1,5-2 кг/га), Купроксат, КС (5-6 л/га) и другие.

По вопросам проведения обследований, выбора фунгицида и консультаций в области защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике Крым.

**\*Важно!**

Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.